

Lugano, 22 novembre 2022


n° 1746: raccomandazioni UFSP sul COVID

Alla luce anche della nuova variante "Cerberus", l'Ufficio federale della sanità ha pubblicato un aggiornamento delle raccomandazioni per la vaccinazione. Per i datori di lavoro sarebbe dunque opportuno verificare che i propri dipendenti possano essere tutelati (art. 328 CO).

In allegato il grafico dei consigli.

Raccomandazione di vaccinazione anti-COVID-19 nell'autunno/inverno 2022

Per effettuare la vaccinazione di richiamo deve essere rispettato un intervallo minimo di 4 mesi dall'ultima vaccinazione o infezione nota.
Per ulteriori informazioni e indicazioni sui dosaggi si rimanda alla tabella riassuntiva nell'allegato 1 della raccomandazione di vaccinazione.



Preferibilmente vaccini a mRNA bivalenti o Nuvaxovid®; vaccini a mRNA monovalenti se non sono disponibili vaccini bivalenti. La vaccinazione con Nuvaxovid® non è raccomandata alle donne in gravidanza o in allattamento.

Alle persone con grave immunodeficienza sono raccomandati i vaccini a mRNA monovalenti. A discrezione del medico, è possibile impiegare i vaccini a mRNA bivalenti nelle persone >= 16 anni. Alle persone < 30 anni si raccomanda preferibilmente la vaccinazione con Comirnaty®.

5-11 anni: Comirnaty® monovalente (dosaggio per bambini)
12-15 anni: preferibilmente Comirnaty® monovalente o Nuvaxovid®

Possibile alternativa per le persone non vaccinate

- >= 16 anni: 2 dosi di vaccino a mRNA monovalente (< 30 anni di preferenza Comirnaty®) o di Nuvaxovid® a distanza di 4 settimane.
- Bambini e adolescenti di 5-15 anni che non hanno ancora contratto l'infezione: 2 dosi a distanza di 4 settimane.